

## **CHICKENPOX:**

Child who gets chickenpox can often develop a rash of spots. Spots look like blisters on the red skin all over the body.

After the 24/48 h, the fluid in blisters gets cloudy and it begin to crust it over.

**Il bambino con la varicella può spesso sviluppare un'eruzione cutanea di macchie. I punti sembrano vesciche sulla pelle rossa, che si spargono su tutto il corpo.**

**Dopo le 24/48 ore, il liquido nelle vesciche diventa torbido e comincia a incrostarsi.**

The virus that caused the disease is the VZV. Person can infect other people trough droplets that are in the air.

**Il virus che causa la malattia è il VZV. Le persone possono infettare altre persone tramite le goccioline che ci sono nell'aria.**

The Symptoms are: in children they are mild, but the adults can be threatening. They can include fatigue, irritability one or two days before rash begins, itchy on the trunk, face and under the armpits, on the upper arms and legs and inside the mouth. They can also cause feeling ill and decreased appetite.

**I sintomi sono: nei bambini lievi, ma negli adulti possono essere pericolosi. Possono includere affaticamento, irritabilità uno o due**

giorni prima dell'inizio dell'eruzione cutanea, prurito sul tronco, sul viso e sotto le ascelle, sulla parte superiore delle braccia e delle gambe e nella bocca. Possono anche causare sensazione di malessere e diminuzione dell'appetito.

The therapy: there are no medicine that can cure the illness. The doctor can give tachipirina to help the child to feel better, put cold clothes and drink a lot. It is worth doing to give not aspirina to child lower 12 Year Old because it can cause the Syndrome of Reye.

La terapia: non esistono medicine che possano curare la malattia. Il dottore può prescrivere la tachipirina per aiutare il bambino a sentirsi meglio, mettere vestiti freschi e bere molto. E' consigliato non far assumere l'aspirina a bambini di età inferiore ai 12 anni perché può causare la sindrome di Reye.

Children can return to school after 7 days from the first day of the rash on the skin.

I bambini possono tornare a scuola dopo 7 giorni dalla comparsa del primo rash cutaneo.

The Prevention: children shall be vaccinated to reduce the difficult symptoms.

La prevenzione: i bambini devono venire vaccinati per ridurre i sintomi.