

MALATTIE INFETTIVE:

Determinate da agenti patogeni che entrano in contatto con un individuo. Possono essere: virus, batteri o funghi.

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI:

Le malattie sessualmente trasmissibili sono caratterizzate da comune prevenzione e trasmissione.

La prevenzione di queste malattie si ha con l'utilizzo di profilattico.

La trasmissione può avvenire in diversi modi, ma la più comune è tramite il rapporto sessuale.

Le patologie sono:

- HIV
- GONORREA
- TRICOMONIASI
- SIFILIDE

HIV:

La trasmissione può avvenire per:

- contatto diretto con sangue o liquidi corporei di persone affette
- rapporto sessuale non protetto
- trasmissione da madre infetta al feto (figlio)

L'insorgenza è dovuta all'infettività virus.

I sintomi sono diversi, dopo 2-4 settimane iniziano a comparire sintomi simili a quelli influenzali. A distanza di mesi o anni possiamo invece trovare:

- mal di testa
- febbre
- dolori addominali
- linfonodi gonfi

- sonnolenza
- stanchezza
- perdita di peso

Non esistono per il momento, vaccini o medicine per la prevenzione di questa malattia, solamente profilattico.

La diagnosi avviene con la ricerca del virus all'interno del siero (sangue).

Al momento non c'è una cura specifica.

GONORREA:

La trasmissione avviene per rapporti sessuali non protetti.

L'insorgenza è dovuta all'infettività del batterio.

I sintomi tipici sono, per l'uomo dolori durante l'urinazione, dolori ai testicoli e prostata. Per la donna invece dolori e perdite durante l'urinazione.

Può causare gravi conseguenze durante la gravidanza se non curata.

La prevenzione avviene solo con l'utilizzo del profilattico.

La diagnosi invece deve avvenire in laboratorio.

La cura avviene per con l'utilizzo di antibiotici.

TRICOMONIASI:

La trasmissione avviene per rapporto sessuale non protetto.

L'insorgenza della malattia è dovuta all'infettività dei protozoi.

I sintomi tipici sono:

- perdite vaginali di colore giallo-verde
- dolore durante rapporti sessuali

La prevenzione può essere fatta solamente con l'utilizzo di profilattici durante i rapporti, quindi avere rapporti sessuali protetti.

La diagnosi avviene tramite la ricerca di protozoi nel secreto vaginale o sperma.

La cura avviene tramite l'assunzione di antibiotici per via orale o sotto forma topica.

SIFILIDE:

La trasmissione avviene in modo cutaneo o con rapporti sessuali non protetti.

L'insorgenza è causata da batterio infetto.

I sintomi tipici sono:

- comparsa di noduli intorno a ulcera
- eruzione cutanea
- lesioni dell'apparato digerente, scheletrico, occhi, lingua
- morte (solo nei casi più gravi e se non trattata)

La prevenzione non esiste ancora vaccino, l'unico modo al momento è avere rapporti protetti.

La diagnosi avviene tramite prelievo ed esame del sangue.

La cura avviene per via antibiotica.